

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek **Alliofil**[®] ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii.

ALLIOFIL[®]

Allii sativi bulbus + Urticae folium

200 mg + 53,5 mg

tabletki dojelitowe

SKŁAD

1 tabletki zawiera:

substancje czynne: czosnek suszony (*Allii sativi bulbus*) 200 mg;

sproszkowany liść pokrzywy (*Urticae folium*) 53,5 mg.

substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna typ 112, celuloza mikrokrystaliczna typ 200, myvatex, magnezu stearynian, powidon, talk, acetylocelulozy ftalan, trietylu cytrynian, polisorbata 80, lak indygotyny E 132, lak żółci chinolinowej E 104

Dostępne opakowania: 2 blistry po 15 tabletek w kartoniku.

WYTWÓRCA

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek **Alliofil**[®] i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek **Alliofil**[®]
3. Jak stosować lek **Alliofil**[®]
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku **Alliofil**[®]
6. Inne informacje

1. Co to jest lek **Alliofil[®] i w jakim celu się go stosuje**

Alliofil[®] jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Lek **Alliofil**[®] stosuje się tradycyjnie w łagodnych postaciach hiperlipidemii, w profilaktyce miażdżycy i profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych.

2. Zanim zastosuje się lek **Alliofil[®]**

Nie należy stosować leku **Alliofil**[®] w przypadku:

Uczulenia na związki siarkowe, niewydolności wątroby, astmy oskrzelowej oraz alergii pokarmowej. Związki siarkowe czosnku wydalane są przez skórę z potem oraz przez płuca co w konsekwencji powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.

Stosowanie u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią, ponieważ związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Stosowanie preparatu nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Istnieje możliwość interakcji z niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi. *Alliofil*[®] może wzmacniać działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwplatekcyjnych.

3. Jak stosować lek *Alliofil*[®]

W łagodnych postaciach hiperlipidemii i w profilaktyce miażdżycy: dorośli 3 razy dziennie po 1-2 tabletek.

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 3-6 tabletek.

Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek. Skuteczność obserwuje się po przyjmowaniu leku przez dłuższy czas.

W przypadku zażycia większej dawki leku *Alliofil*[®] niż zalecana

Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia nasilonych działań niepożądanych.

W przypadku przedawkowania należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku *Alliofil*[®]

Istnieje możliwość bezpiecznego powrotu do poprzedniego schematu leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, *Alliofil*[®] może powodować działania niepożądane.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych nieopisanych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku *Alliofil*[®]

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25° C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

*Nie należy stosować leku *Alliofil*[®] po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu*

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00, fax. + 48 61 853 60 58

Data opracowania ulotki:

Projekt treści etykiety na opakowaniu bezpośrednim (blister)

ALLIOFIL[®]

Allii sativi bulbus + Urticae folium

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Nr serii

Termin ważności

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego.

ALLIOFIL®

Allii sativi bulbus + Urticae folium

200 mg + 53,5 mg

tabletki dojelitowe

Skład:

1 tabletki zawiera: czosnek suszony (*Allii sativi bulbus*) 200 mg; sproszkowany liść pokrzywy (*Urticae folium*) 53,5 mg.

Zawartość opakowania

30 szt.

Sposób użycia:

W łagodnych postaciach hiperlipidemii i w profilaktyce miażdżycy: dorośli 3 razy dziennie po 1-2 tabletek. W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 3-6 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek. Skuteczność obserwuje się po przyjmowaniu leku przez dłuższy czas.

Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii

Pozwolenie nr R/0062

Kod EAN UCC: 5 9 0 9 9 9 0 0 0 6 2 2 P

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a