

Cynarex®

Cynarae herbae extractum siccum tabletki, 250 mg

1 tabletki zawiera

- **Substancja czynna:**
Wyciąg suchy z ziela karczocha (Cynarae herbae extractum siccum 3-5:1) - 250 mg
(ekstrahent: etanol 50% v/v)
- **Substancje pomocnicze:**
Celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu, krospowidon, magnezu stearynian, talk

1 tabletki zawiera nie mniej niż 4,5 mg polifenolokwasów w przeliczeniu na kwas kawowy.

Opakowanie zawiera: 30 tabletek.

Co to jest lek Cynarex® i w jakim celu się go stosuje

Cynarex® jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności, osłabieniu wydzielania żółci. Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek obniżający poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi (profilaktyka miażdżycy) oraz tradycyjnie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla).

Zanim zastosuje się lek Cynarex®

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Asteraceae = Compositae) oraz niedrożności dróg żółciowych.

W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinny poradzić się lekarza.

Jeśli objawy nasilą się należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Cynarex® u dzieci:

Nie stosować u dzieci poniżej 14 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono wpływu na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi i obsługujące maszyny.

Jak stosować lek Cynarex[®]

Doustnie, dorośli i młodzież powyżej 14 lat: w niestrawności jednorazowo 2 tabletki, pomocniczo w hipercholesterolemii lub jako środek ochronny u osób narażonych na działanie substancji toksycznych wydalanych z żółcią (m.in. dwusiarczku węgla) 3 razy dziennie po 2 tabletki.

W hipercholesterolemii oraz jako środek ochronny Cynarex[®] wymaga systematycznego stosowania.

W przypadku zażycia większej dawki leku Cynarex[®]

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Alergia kontaktowa u osób uczulonych na karczochy lub inne rośliny z rodziny Astrowatych (Asteraceae = Compositae). W rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Poza tym w zalecanych dawkach nie obserwowano objawów niepożądanych.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Cynarex[®]

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 Wrocław -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40