

Raphacholin C[®]

tabletki drażowane

1 tabletka drażowana zawiera

- **Substancje czynne:**
 - Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis
 - (wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) - 150 mg (DER 18:1, ekstrahent: etanol 85 % V/V)
 - Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela karczocha)- 47 mg (DER 3:1, ekstrahent: etanol 50 % V/V)
 - Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) - 40 mg
 - Menthae piperitae oleum (olejek miętowy)- 15 mg
- **Substancje pomocnicze:**
 - skrobia ziemniaczana, sacharoza, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna,
 - magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan, węgiel leczniczy

Opakowanie: 30 tabletek drażowanych.

Co to jest lek Raphacholin C[®] i w jakim celu się go stosuje

Raphacholin C[®] jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Raphacholin C[®] zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy. Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci). Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci, co działa ochronnie na mięszs wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania do stosowania:

Raphacholin C[®] tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Zanim zastosuje się lek Raphacholin C[®]

Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Raphacholin C[®] u dzieci

Po konsultacji z lekarzem można stosować u dzieci powyżej 10 roku życia 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie po posiłku.

Ciąża

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w tym okresie.

Karmienie piersią

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią. Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Raphacholin C[®] na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami. W dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi i moczopędnymi, potencjalnie może powodować hipokaliemię.

Jak stosować lek Raphacholin C[®]

Lek stosować doustnie.

Dorośli - w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2 tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem.

Po konsultacji z lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C[®] niż zalecana

W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki (jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek drażowanych), sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudności.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Raphacholin C[®] może powodować działania niepożądane. Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy

poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Raphacholin C[®]

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Raphacholin C[®] należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "**Herbapol**" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 **Wrocław** -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40