

Terpichol[®]

kapsułka miękka

Skład

1 kapsułka zawiera następujące substancje czynne:

- Mentholum (Mentol) - 40,0 mg, α -Pinenum (α -Pinen) - 21,25 mg,
- Menthonum (Menton) - 7,5 mg, Borneolum (Borneol) - 6,25 mg,
- Camphenum (Kamfen) - 6,25 mg, Cineolum (Cyneol) - 2,5 mg,
- Olive oleum virginalle (olej z oliwek pierwszego tłoczenia) - 41,25 mg.

W skład kapsułki miękkiej (osłonki) wchodzi: żelatyna, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Opakowanie: 2 blistry po 30 kapsułek miękkich.

Co to jest lek TERPICHOL[®] i w jakim celu się go stosuje

TERPICHOL[®] jest produktem zawierającym kompozycję mentolu, α -pinenu, mentonu, borneolu, kamfenu, cyneolu. Lek zmniejsza dolegliwości trawienne, zwiększa ilość i szybkość wydzielania żółci.

Wskazania do stosowania

Stosuje się w zaburzeniach wydzielania żółci przez wątrobę, pomocniczo w stanach skurczowych dróg żółciowych.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku TERPICHOL[®]

Kiedy nie stosować leku TERPICHOL[®]

Preparat nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na wymienione substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (w szczególności pochodne kwasu parahydroksybenzoesowego) oraz w ostrym stanie zapalnym dróg żółciowych, przy uszkodzeniu lub marskości wątroby, w chorobie zapalnej i niewydolności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek TERPICHOL[®]

W przypadku, gdy u pacjenta występuje kamica żółciowa, stan zapalny w obrębie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku TERPICHOL[®] z innymi lekami

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem i powiedzieć o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku TERPICHOL[®] u dzieci

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

TERPICHOL[®] nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jak stosować lek TERPICHOL[®]

Doustnie.

Dorośli 2 do 4 razy dziennie po 1 kapsułce.

Młodzież powyżej 12 roku życia 1 do 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Zażycie większej dawki leku TERPICHOL[®] niż zalecana

Nie opisano przypadków przedawkowania. W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, TERPICHOL[®] może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, odbijanie i nieprzyjemny smak w ustach.

Jak przechowywać lek TERPICHOL[®]

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 Wrocław -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40