

Halset®

Cetylpyridinii chloridum
1,5 mg, tabletki do ssania

Likwiduje stany zapalne gardła i jamy ustnej

Wskazania: Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Halset jeśli występuje: nadwrażliwość (uczulenie) na chlorek cetylpirydyniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, nietolerancja fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna). Nie stosować u małych dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie produktu oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Halset®

Cetylpyridini chloridum
Tabletki do ssania

Skład

1 tabletkę zawiera: Cetylpyridinium chloratum monohydr. 1.5 mg Sorbitolum, corrigentia, masa tabulettae q.s.

Właściwości i działanie

Halset wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz przeciwgrzybicze (*Candida albicans*) w zapaleniach jamy ustnej i gardła. Z uwagi na brak cukru Halset nie przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów. Lek jest dobrze tolerowany.

Zastosowanie

Stosuje się zapobiegawczo i leczniczo przy lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Sposób użycia

Tabletkę ssać powoli w celu osiągnięcia optymalnego działania leku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież: ssać 1 tabletkę w odstępie 1-2 godzi (maksymalnie 8 tabletek dziennie).
Dzieci: ssać 1 tabletkę w odstępie 2-3 godzin (maksymalnie 6 tabletek dziennie).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku, nietolerancja fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna). Nie stosować u małych dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką. Z przyczyn ogólnolekarskich nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Działania uboczne

Rzadko występują reakcje alergiczne (np. wypryski skórne) i przemijające zaburzenia smaku.

Szczególne wskazówki w celu bezpiecznego stosowania

Przy pierwszych objawach reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się z lekarzem. Niezależnie od stosowania preparatu Halset, przy ciężkich zapaleniach lub bólach gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami, lub wymiotami, niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

Stosowanie większej ilości tabletek niż jest zalecane, nie zwiększa skuteczności działania i może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę (szczególnie u dzieci).