

SALICORTEX®

(*Salicis cortex*)

tabletki, 330 mg

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Salicortex® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli gorączka utrzyma się przez 3 dni leczenia lub przekroczy 39°C, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Jeśli objawy dolegliwości reumatycznych utrzymują się lub nasilą po tygodniu terapii, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jedna tabletki zawiera nie mniej niż 20 mg glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.

Skład:

kora wierzby - 330 mg

Składniki pomocnicze: skrobia ziemniaczana, koloidalny dwutlenek krzemu.

1. Co to jest lek Salicortex® i w jakim celu się go stosuje?

Jest to preparat w postaci tabletek. Stosuje się go w bólach głowy, chorobach z „przeziębienia”, z gorączką oraz pomocniczo w dolegliwościach reumatycznych.

2. Zanim zastosuje się lek Salicortex®:

Nie jest zalecane stosowanie preparatów zawierających korę wierzby u osób z nadwrażliwością na salicylany, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz u osób z astmą (ze względu na możliwość wywołania skurczu oskrzeli).

Zachować szczególną ostrożność:

występuje ostra niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, deficyt dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. W powyższych przypadkach stosowanie leku jest możliwe jedynie pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku u dzieci:

Nie należy stosować poniżej 16 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować w ciąży i podczas laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie wykazano wpływu.

Stosowanie innych leków:

Kora wierzby może nasilać działanie środków przeciwzakrzepowych, takich jak heparyna oraz pochodne kumaryny

3. Jak stosować lek Salicortex®?

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 – 2 tabletki 3 razy dziennie po jedzeniu. Zaleca się popicie dużą ilością ciepłego płynu.

W przypadku zażycia większej dawki leku Salicortex® niż zalecana:

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Salicortex®:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane:

Kora wierzby może powodować objawy nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka lub astma oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Salicortex®:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne „Labofarm”

mgr farm. Tadeusz Pawełek

83-200 Starogard Gdański

ul. Lubichowska 176 b

tel. 058 561-20-08

fax 058 561-20-16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Dostępne opakowania:

20 lub 60 lub 90 tabletek