

## **Tussal® Antitussicum**

*Dextromethorphanum hydrobromidum*

15 mg, tabletki powlekane

Na kaszel suchy

**Podmiot odpowiedzialny:** Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

### **Skład leku**

Jedna tabletkę zawiera substancję czynną: 15 mg bromowodoru dekstrometorfanu oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokryształiczną, laktozę jednowodną, skrobię, stearynian magnezu, hydroksypropylometylocelulozę, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy 400.

### **Opis działania**

Preparat Tussal® zawiera dekstrometorfan, przeciwkaszlowy środek z grupy pochodnych fenantrenu. Dekstrometorfan działa hamująco na ośrodek kaszlu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, a jego siła działania jest porównywalna do równoważnej dawki kodeiny. Nie wywołuje objawów niepożądanych typowych dla kodeiny, takich jak zaburzenia oddychania, obrzęk płuc, zaparcia, nudności i wymioty, suchość w jamie ustnej, bóle głowy, nie powoduje lekozależności. W dawkach leczniczych nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli.

Dekstrometorfan jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i zaczyna działać po 15-30 min od chwili podania. Działanie terapeutyczne utrzymuje się przez 3-6 godzin od podania. U dzieci jest ono o połowę dłuższe. Dekstrometorfan wydalaný jest z moczem, głównie w postaci odmetylowanych metabolitów (80-90%), a także w postaci nie zmienionej (10-20%). Śladowe ilości tych związków wydalané są z kałem. W ciągu 12-48 godzin dochodzi do całkowitego usunięcia leku z organizmu.

**Wskazania:** Stosowany w objawowym leczeniu suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

**Przeciwwskazania:** Uczulenie (nadwrażliwość) na bromowodorek dekstrometorfanu, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tussal Antitussicum, występująca astma oskrzelowa i stany zapalne dolnych dróg oddechowych, niewydolność oddechowa lub istniejące ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy lub przyjmowanie tych leków w ciągu ostatnich 14 dni, występujący kaszel z odkrztuszaniem, karmienie piersią, dziecko poniżej 6 lat.

### **Ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności**

Jeśli, mimo stosowania leku Tussal®, kaszel utrzymuje się ponad 4 dni i choroba przebiega z gorączką, bólami głowy bądź wysypką, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leku nie stosować w kaszlu z odkrztuszaniem. Nie przyjmować przed upływem 14 dni od zaprzestania leczenia inhibitorami MAO. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Nie stwierdzono działania karcinogennego i mutagennego dekstrometorfanu.

### **Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią**

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo czy dekstrometorfan przenika do mleka matki, dlatego należy rozważyć, czy przerwać karmienie piersią czy zaprzestać stosowania leku.

### **Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi**

Tussal® może upośledzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń będących w ruchu.

### **Oddziaływanie z innymi lekami**

Dekstrometorfan stosowany z inhibitorami MAO może wywołać senność, nudności, wysoką gorączkę oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Równoczesne podawanie z chinidyną może hamować metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi.

### **Dawkowanie i sposób stosowania**

Lek podaje się doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat 1 tabletkę co 4 godziny; przed snem dawkę można zwiększyć do 2 tabletek. Maksymalna dawka dobowa wynosi 120 mg. Dzieciom w wieku 6-12 lat należy podawać połowę dawki dla dorosłych (pół tabletki co 4 godziny lub 1 tabletkę co 6 do 9 godzin). Rowek na powierzchni tabletki umożliwia jej dzielenie.

U osób w wieku podeszłym nie ma potrzeby zmiany sposobu dawkowania.

### **Przedawkowanie**

Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (niepokój, nerwowość), niezborność ruchów (ataksja). W razie znacznego przedawkowania może wystąpić zahamowanie czynności ośrodka oddechowego.

### **Działania niepożądane**

Dekstrometorfan może spowodować wystąpienie działań niepożądanych wpływających na sprawność psychofizyczną jak zawroty głowy, senność, dolegliwości żołądkowo-jelitowe jak nudności, wymioty, bóle żołądka

### **Dostępne opakowania**

10 tabletek w blistrze zapakowanym w kartonik

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie produktu oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.