

## Radirex®

tabletki

Rhei radix pulveratum, 513,5 mg, tabletki

### 1 tabletką zawiera:

- **Substancja czynna:** Rhei radix pulveratum (sproszkowany korzeń rzewienia) - 513,5 mg
- **Substancje pomocnicze:** Kropowidon, talk

1 tabletką zawiera średnio 12,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę.

**Opakowanie :** 10 tabletek.

## Co to jest lek Radirex® i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Radirex® są produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

### Wskazania do stosowania

Radirex® stosuje się tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

## Zanim zastosuje się lek Radirex®

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, niedrożność jelit, atonia jelit, ostre i przewlekłe choroby zapalne jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie wyrostka robaczkowego, guzki krwawnicze, zapalenie kłębuszków nerkowych, kamica szczawianowa, biegunka, odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe oraz bóle brzucha o niejasnej etiologii.

### Zachować szczególną ostrożność stosując lek Radirex®, gdyż:

Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych środków przeczyszczających, także leku Radirex® nie należy podawać jeśli występują jakiegokolwiek niezdiagnozowane objawy ostrego lub uporczywego bólu brzucha.

Jeśli konieczne jest codzienne przyjmowanie środków przeczyszczających, wówczas należy zwrócić się do specjalisty o zbadanie przyczyn zaparcia. Należy unikać długotrwałego przyjmowania środków przeczyszczających.

Przy kuracji tymi lekami trwającej ponad 2 tygodnie konieczny jest nadzór lekarski. Przewlekłe stosowanie może spowodować odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosis coli), jednakże jest to zjawisko nieszkodliwe i ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania leku.

Nadużywanie leku Radirex® prowadzące do strat płynów i elektrolitów, może spowodować uzależnienie związane z koniecznością przyjmowania zwiększonych dawek leku w celu uzyskania efektu przeczyszczającego.

Nadużywanie spowodować może zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie obniżenie poziomu potasu), zaburzenia funkcjonowania okrężnicy ( zanik prawidłowego napięcia mięśni gładkich ).

Obniżenie poziomu potasu może prowadzić do zaburzeń pracy serca i zaburzeń nerwowo-mięśniowych, szczególnie w przypadku jednoczesnego przyjmowania glikozydów nasercowych, diuretyków lub kortykosteroidów.

Przyjmowanie przez dłuższy okres środków przeczyszczających zawierających antranoidy może spowodować nasilenie zaparć.

Przewlekłe stosowanie może prowadzić do wystąpienia białkomoczu i krwiomoczu.

Stosowanie stymulujących środków przeczyszczających przy przewlekłych zaparciach, nie może zastąpić konieczności zmiany diety.

Należy unikać stosowania leku podczas miesiączki.

## **Stosowanie leku Radirex<sup>®</sup> u dzieci**

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

## **Stosowanie leku Radirex<sup>®</sup> w okresie ciąży i karmienia piersią**

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

## **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

## **Stosowanie innych leków**

Działanie glikozydów nasercowych może ulec nasileniu w przypadku obniżenia poziomu potasu, spowodowanego nadużywaniem preparatów z rzewienia. Obniżenie poziomu potasu może wpływać na działanie równocześnie stosowanych leków antyarytmicznych i glikozydów nasercowych.

Stosowane równocześnie środki moczopędne, sterydy kory nadnerczy czy korzeń lukrecji mogą zwiększyć utratę potasu.

## **Jak stosować lek Radirex<sup>®</sup>**

Doustnie: dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia 2 tabletki jednorazowo, najlepiej przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 3 tabletek dziennie. Działanie przeczyszczające następuje po 6-8 godzinach.

Najodpowiedniejszą dawką indywidualną jest najmniejsza dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.

## **W przypadku zażycia większej dawki leku Radirex<sup>®</sup> niż zalecana**

Przedawkowanie leku może spowodować gwałtowną biegunkę, prowadzącą do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, z typowymi następstwami jak m.in. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe. Przy przedawkowaniu należy doprowadzić do zbilansowania płynów i elektrolitów w ustroju.

## **Możliwe działania niepożądane**

Zwykle nie obserwuje się działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki preparatu, biegunka, obniżenie poziomu potasu (hipokaliemia), skurcze oraz bóle brzucha, szczególnie u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Żółte lub czerwono-brązowe (w zależności od pH) zabarwienie moczu wywołane przez metabolity leku jest nieistotne klinicznie i ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku.

## **Przechowywanie leku Radirex<sup>®</sup>**

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "**Herbapol**" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 **Wrocław** -  
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40