

Castagnus®

tabletki

Skład: tabletki zawiera :

- **Substancja czynna :**
Agni casti fructus extractum siccum - 45 mg
(DER 7-13:1, etanol 60 % m/m, wyciąg natywny 10 %, glukoza 90 %)
- **Substancje pomocnicze :**
laktoza, skrobia ziemniaczana, powidon, stearynian magnezu.

Opakowanie jednostkowe stanowi kartonik zawierający 30 tabletek.

Co to jest Castagnus® i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Castagnus® poprzez stymulację receptorów dopaminergicznych obniżają poziom prolaktyny wydzielanej przez przysadkę, powodują ustępowanie zaburzeń wywołanych przez hiperprolaktynemię: zespołu napięcia przedmiesiączkowego i zaburzeń cyklu miesięczkowego.

Wskazania do stosowania:

- zaburzenia cyklu miesięczkowego (menstruacji i cyklu miesięczkowego spowodowane przejściową lub trwałą niedoczynnością ciała żółtego, objawiające się nadmiernym krwawieniem lub zbyt częstym dodatkowym krwawieniem w cyklu)
- zespół napięcia przedmiesiączkowego (to znaczy dolegliwości pojawiające się na krótko przed pojawieniem się miesiączki, objawiające się: bolesnością i uczuciem obrzmienia piersi (mastodynia), zaburzeniami równowagi emocjonalnej, bólami głowy typu migrenowego, obrzmieniem okolic twarzy, rąk i stóp).

Zanim zastosuje się Castagnus®

Nie należy stosować leku Castagnus® przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią :

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek uważany za bezpieczny, nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie środków zawierających progesteron lub gestageny (np. doustnych środków antykoncepcyjnych) może wzmacniać działanie leku.

Jak stosować lek Castagnus®

Doustnie, dorosłym kobietom o wadze do 60 kg po 1 tabletkę, a kobietom o wadze wyższej niż 60 kg po 2 tabletki, rano, przez 90 dni.

Możliwe działania niepożądane:

W trakcie leczenia mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz alergiczne reakcje skórne.

Przechowywanie leku:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25° C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności, podanym na opakowaniu.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 Wrocław -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40