

Hederoin®

tabletki

Hederae heliis folii extractum siccum 15 mg, tabletki

1 tabletki zawiera

- **Substancja czynna:**
Wyciąg suchy z liści bluszczu pospolitego (Hederae heliis folii extractum siccum, DER 4-8:1) -15 mg
[ekstrahent: etanol 30 % m/m]
- **Substancje pomocnicze:**
wyciąg z korzenia lukrecji suchy z celulozą sproszkowaną, olejek anyżowy, skrobia ziemniaczana, sacharoza, powidon, talk

Opakowanie zawiera 30 tabletek

Co to jest lek Hederoin® i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Hederoin® zawierają wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae heliis folii extractum siccum). Preparat stosuje się jako środek wykrztuśny i łagodnie bronchospazmolityczny, rozrzedzający zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i oskrzelach i ułatwiający odkrztuszanie.

Wskazania do stosowania:

Tabletki Hederoin® stosuje się tradycyjnie w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej gęstej wydzieliny oraz pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Zanim zastosuje się lek Hederoin®

Nie należy stosować leku Hederoin® jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża:

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie leku w tym okresie należy skonsultować z lekarzem.

Karmienie piersią:

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie karmienia piersią. Stosowanie leku w tym okresie należy skonsultować z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono upośledzenia sprawności psychofizycznej przez preparat.

Stosowanie innych leków:

interakcje z innymi lekami nie są znane.

Jak stosować lek Hederoin[®]

Lek Hederoin[®] należy stosować doustnie.

Dzieci w wieku szkolnym 3 razy dziennie po 1 tabletkę, dorośli 3 razy dziennie po 2 tabletki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hederoin[®] niż zalecana:

Zalecanych dawek nie należy przekraczać.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia objawów niepożądanych, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pominięcia dawki leku Hederoin[®]:

Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Hederoin[®] może wystąpić:

Przerwanie leczenia tabletkami Hederoin[®] może spowodować nasilenie trudności w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle, krtani i oskrzelach. Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż tydzień. Jeżeli objawy nie ustępują lub w trakcie leczenia dochodzi do pogorszenia stanu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Hederoin[®] może powodować działania niepożądane.

U wrażliwych pacjentów, po zażyciu większej niż zalecana dawki leku, mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty, biegunki.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywanie leku Hederoin®

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Hederoin® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "**Herbapol**" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 **Wrocław** -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40