

Tussal® Expectorans
Ambroxoli hydrochloridum
30 mg, tabletki

Na kaszel mokry

Tussal® Expectorans

Ambroxoli Hydrochloridum

Tabletki 30 mg

Skład jednej tabletki

Substancja czynna: chlorowodorek ambroksolu 30 mg.

Substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu oraz skrobia modyfikowana

Opis działania

Ambroksol jest czynnym metabolitem bromheksyny. Działa mukolitycznie i sekretolitycznie, stymuluje dojrzewanie i wydzielanie pęcherzykowego i oskrzelowego surfaktantu, zwiększa produkcję surowiczej wydzieliny oskrzelowej, zmniejsza lepkość śluzu, zwiększa ruchliwość rzęsek nabłonka oddechowego. Dzięki temu ułatwia odkrztuszanie, przyspiesza oczyszczanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny, zmniejsza intensywność i częstość odruchu kaszlowego, normalizuje produkcję płwociny.

TUSSAL® EXPECTORANS ulega szybkiemu i niemal całkowitemu wchłonięciu, jego działanie rozpoczyna się po około 30 minutach i utrzymuje się przez kilka godzin. W postaci zmetabolizowanej jest wydalany z moczem.

Wskazania do stosowania

Tabletki TUSSAL® EXPECTORANS stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu oddechowego przebiegających z nieprawidłowym wydzielaniem, nadmiernym zęszczeniu i utrudnionym wykrztuszaniem śluzu powstającego w oskrzelach i oskrzelikach, np.:

- ostre lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub płuc,
- astma oskrzelowa (patrz Ostrzeżenia),
- rozedma płuc,
- mukowiscydoza,
- stany zapalne krtani, nosa, gardła i zatok.

Przeciwwskazania

Tabletek TUSSAL® EXPECTORANS nie podaje się chorym z nadwrażliwością na którykolwiek składnik leku.

Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u chorych z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. U osób z niewydolnością nerek należy obniżyć zalecaną dawkę leku. TUSSAL®-EXPECTORANS stosowany jako lek wspomagający u chorych z astmą oskrzelową może początkowo nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie. Osoby w podeszłym wieku mogą stosować TUSSAL® EXPECTORANS według ogólnych zasad.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią

TUSSAL® EXPECTORANS może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, na wyraźne zalecenie lekarza. Lek przechodzi do mleka karmiących matek. Nie są znane przypadki aby przyjmowany w zalecanych dawkach terapeutycznych wywierał niekorzystny wpływ na niemowlę.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi

Przyjmowanie leku TUSSAL® EXPECTORANS nie wywiera negatywnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi oraz obsługiwanie urządzeń będących w ruchu.

Interakcje

Jednoczesne podawanie leków przeciwkaszlowych może wskutek hamowania odruchu kaszlu ograniczać wydzielanie się śluzu i powodować gromadzenie się wydzieliny. TUSSAL® EXPECTORANS podawany z niektórymi antybiotykami (amoksycylina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina i cefuroksym) zwiększa ich przenikanie do mięszu płuc i wzmacnia ich działanie. Ambroksol i teofilina wzajemnie nasilają swe działanie. Preparat nie wykazuje interakcji z innymi lekami, w tym podawanymi w leczeniu chorób oskrzeli oraz glikozydów nasercowych, leków moczopędnych.

Dawkowanie i sposób stosowania

Tabletki TUSSAL® EXPECTORANS stosuje się doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia zwykle przyjmują 30 mg (1 tabletka) trzy razy na dobę. W przypadku długotrwałej terapii dawkę zmniejsza się do dwóch tabletek na dobę.

Dzieciom w wieku 6 - 12 lat podaje się połowę dawki dla dorosłych, czyli trzy razy na dobę po 15 mg (1/2 tabletki), a w razie długotrwałego stosowania dwa razy na dobę po pół tabletki. Tabletki TUSSAL® EXPECTORANS zażywać należy po posiłkach i popijać niewielką ilością płynu, nie stosować bezpośrednio przed snem

Przedawkowanie

Dotychczas nie stwierdzono przypadków przedawkowania ambroksolu. W razie wystąpienia objawów sugerujących przedawkowanie leku należy zastosować leczenie objawowe.

Działania niepożądane

Ambroksol jest lekiem dobrze tolerowanym. Sporadycznie mogą wystąpić alergiczne odczyny skórne, obrzęk twarzy, ból głowy, bolesność oddawania moczu, wysychanie dróg oddechowych i suchość jamy ustnej względnie zaburzenia czynności przewodu pokarmowego: niestrawność, nudności, wymioty, biegunki lub zaparcia.

Dostępne opakowania

Kartonik zawierający 10 tabletek.

Wskazania: Tussal-Expectorans stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu, np.: ostre lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub płuc, astma oskrzelowa, rozedma płuc, mukowiscydoza.

Przeciwwskazania: Uzulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku, u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie produktu oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.