

Ginkofar[®] forte

Ginkgo bilobae folium extr. Siccum

Skład leku

Jedna tabletką zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na 24% ginkgoflawonoglikozydów, co odpowiada 19,2 mg ginkgo-flawonoglikozydów oraz następujące substancje pomocnicze: laktoza, poliwinylpirolidon, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy, dwutlenek krzemu koloidalny, tlenek żelaza.

Opis działania

Ginkofar[®] forte zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie, hamuje powstawanie obrzęku mózgu i siatkówki oraz przyspiesza resorpcję tych obrzęków. Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznym i adrenergicznym receptorów (2), poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrazenia tkankowego krwi. Ekstrakt miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki i działa neuroprotekcynie. Kliniczne działanie preparatu Ginkofar forte polega na:

- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,
- ochronie komórek przed niedotlenieniem,
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Wskazania do stosowania

Ginkofar[®] forte stosuje się w zaburzeniach:

- krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach,
- krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych - uczucie zimna i bólu w stopach, osłabienie słuchu i wzroku.

Preparat Ginkofar[®] forte stosuje się pomocniczo w miażdżycy naczyń.

Przeciwwskazania

Alergia na składniki preparatu i zła tolerancja leku.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią

Nie są znane niekorzystne działania leku na płód i dzieci karmione piersią. Z tytułu prewencji

ogólnej podczas ciąży i karmienia piersią należy przerwać stosowanie leku Ginkofar[®] forte.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznym oraz sprawność psychofizyczną

Ginkofar[®] forte nie wywiera ujemnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi.

Oddziaływania z innymi lekami

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Dawkowanie i sposób stosowania

Ginkofar Forte podaje się doustnie. Preparat należy przyjmować po posiłku, popijając tabletkę płynem.

W zaburzeniach krążenia mózgowego lek stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletkę. W zaburzeniach krążenia obwodowego lek stosuje się 2 razy na dobę po 1 tabletkę. Zasadnicza terapia powinna trwać 8 do 12 tygodni. Po niej wskazane jest przyjmowanie leku 1 do 2 razy na dobę po 1 tabletkę.

Przedawkowanie

Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym wystąpić mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe, goniłwa myśli, bóle głowy.

Działania niepożądane

Rzadko występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym.

Dostępne opakowania

Kartoniki po 20, 60 lub 90 tabletek.