

Soyfem[®]

Glycine max. semen extr. sicc.

100 mg

tabletki powlekane

Skład leku

Jedna tabletkę zawiera 100 mg wyciągu z nasion soi (w tym 26 mg zespołu izoflawonów przeliczonych na genisteinę) oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, poliwinylpyrolidon, stearynian magnezu, hydroksypropylo-metylocelulozę, talk oraz glicerynę.

Opis działania

W preparacie Soyfem główne substancje aktywne stanowią genisteina i daidzena, zaliczane do izoflawonów. Posiadają one zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi, co wynika z podobieństwa ich budowy chemicznej do endogennych estrogenów (tzn. wytwarzanych przez organizm), dlatego popularnie nazywa się je fitoestrogenami.

Fitoestrogeny genisteina i daidzena zawarte w soi, działając podobnie do estrogenów, tylko słabiej, chronią przed zaburzeniami związanymi z fizjologicznym spadkiem produkcji estrogenów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym.

Wskazania do stosowania

Preparat Soyfem stosuje się:

- u kobiet z dolegliwościami okresu menopauzy : przyływami uczucia gorąca, nadmiernym poceniem się, zakłóceniami snu, uczuciem napięcia nerwowego i niepokoju.
- w profilaktyce chorób układu krążenia, wraz zachowaniem odpowiedniej diety.

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono.

Ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności

Dla preparatów zawierających izoflawony nie są wymagane specjalne środki ostrożności. Ze względu na słabe działanie estrogenne, zaleca się przeprowadzenie wywiadu z pacjentką na temat równoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczny

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn oraz nie upośledza sprawności psychofizycznej.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje)

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Dawkowanie i sposób podawania

Lek przyjmuje się doustnie 2 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.

Przedawkowanie

Nie opisywano.

Działania niepożądane

Przy zalecanym dawkowaniu objawy niepożądane nie są znane.

Dostępne opakowania

30 lub 60 tabletek w blistrach po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie produktu oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.