

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

COLDREX MaxGrip

o smaku cytrynowym

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum)

proszek do sporządzania roztworu (1000 mg +10 mg + 40 mg)/ saszetkę

SKŁAD

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodoru fenylefryny i 40 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: sacharozę, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, skrobię kukurydzianą, cyklamian sodu, sacharynian sodu, bezwodną krzemionkę koloidalną, aromat cytrynowy, naturalną kurkuminę

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5 i 10 saszetek

CO TO JEST COLDREX MAXGRIP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ?

Coldrex MaxGrip jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (paracetamol w maksymalnej dawce), obkurczającym naczynia krwionośne błon śluzowych nosa, zmniejszającym przekrwienie, udroźniającym nos i zatoki - (fenylefryna) i uzupełniającym niedobory witaminy C (kwas askorbowy).

Coldrex MaxGrip jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, katarem, zapaleniem zatok.

ZANIM ZASTOSUJE SIĘ COLDREX MAXGRIP

Nie należy stosować preparatu Coldrex MaxGrip w razie nadwrażliwości na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub inne składniki leku oraz w przypadku niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, chorób serca.

Preparat jest przeciwwskazany u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne oraz u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i 2 tygodnie po ich zastosowaniu.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ STOSUJĄC COLDREX MAXGRIP

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

Stosowanie preparatu u dzieci

Nie zaleca się podawania preparatu dzieciom poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem leku podczas ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Coldrex MaxGrip nie powoduje senności i nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Stosowanie innych leków

Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku zażywania takich preparatów jak metoklopramid, dromperidon, cholestyramina, warfaryna.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

JAK STOSOWAĆ COLDREX MAXGRIP ?

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Jedna saszetka preparatu Coldrex MaxGrip co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej - preparatu Coldrex MaxGrip nie należy stosować dłużej niż siedem

dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.

Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie potrzeby dolać zimnej wody lub dosłodzić.

Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie i przeziębieniu, leków udroźniających nos oraz innych preparatów zawierających paracetamol.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana

W przypadku zażycia więcej niż 4 saszetek preparatu w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko opóźnionego, poważnego uszkodzenia wątroby.

Możliwe działania niepożądane

Lek Coldrex MaxGrip stosowany zgodnie z zaleceniami jest dobrze tolerowany.

Mogą wystąpić wysypki skórne i inne objawy alergiczne związane z zażywaniem paracetamolu. Aminy sympatykomimetyczne mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi z towarzyszącymi mu bólem i zawrotami głowy, wymiotami, biegunką, bezsennością i w rzadkich przypadkach kołataniem serca, jednak informacje o występowaniu objawów niepożądanych po zastosowaniu fenylefryny zgodnie z zaleceniami są nieliczne.

PRZECHOWYWANIE LEKU COLDREX MAXGRIP

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WYTWÓRCA

SmithKline Beecham S.A., Alcala de Henares, Madrid, Hiszpania

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

NUMER REJESTRACJI I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Pozwolenie MZ nr: 9570

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa