

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar, ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

CINNABARIS DAGOMED 3 STANY ZAPALNE ZATOK, KATAR

Granulki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład:

Substancje czynne: Hydrargyrum sulfuraturn rubrum D6, Hepar sulfuris D6, Ferrum phosphoricum D6, Kalium bichromicum D8, Echinacea purpurea D2 aa 0,2 g w 100 g granuliek.

Substancje pomocnicze: sacharozę.

Zawartość leku w opakowaniu: 7g (ok. 175 granuliek)

Podmiot odpowiedzialny: Dagomed Pharma Sp. z o.o., ul. Czorszyńska 6, 01-410 Warszawa

Miejsce wytwarzania: SUN-FARM Sp. z o.o., Człękówka 75, 05-340 Kolbiel

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar
3. Jak stosować lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar
6. Inne informacje

1. Co to jest lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar i w jakim celu się go stosuje.

CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar jest lekiem homeopatycznym w postaci granuliek. Stosuje się wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych z katarę, kaszlem. Wspomagająco w zapaleniu zatok.

2. Zanim zastosuje się lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku u osób uczulonych na Echinacę lub inne rośliny z rodziny Compositae. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia lub ulegną zaostrzeniu (temperatura przekroczy 39°C) należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt zawiera sacharozę. Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, zwłaszcza przy przyjmowaniu zwiększonych dawek w nasilonych objawach oraz u dzieci. 1 dawka (5 granulek) odpowiada ok. 0,02 wymiennika węglowodanowego. Chorzy na gruźlicę, kolagenozy, stwardnienie rozsiane, HIV, AIDS oraz inne schorzenia układu immunologicznego przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar z zjedzeniem i picciem:
Lek należy przyjmować 15 minut przed lub po posiłku.

Stosowanie leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar u dzieci:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie ma wpływu.

Stosowanie innych leków:
Interakcje z innymi lekami są nieznane.

3. Jak stosować lek CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

W nasilonych objawach: przez 3 godz. 1 dawka (5 granulek) co 1/2 godz. W miarę poprawy należy wydłużyć odstęp między dawkami dochodząc do trzech dawek dziennie. Lek stosować nie dłużej niż 5-10 dni. W przypadku braku poprawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane:

Możliwe nadmierne działanie immunostymulujące.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować lekarza.

5. Przechowywanie leku:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku CINNABARIS DAGOMED 3 Stany zapalne zatok, Katar po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Chronić od światła.

6. Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Polska, Dagomed Pharma Sp. z o.o., ul. Czorszyńska 6, 01-410 Warszawa, tel.: 022 837 75 72

Data opracowania ulotki: 10.04.2006