

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Acodin ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

ACODIN 15 mg, tabletki

(Dextromethorphan hydrobromium)

Skład:

1 tabletkę zawiera substancję czynną:

dekstrometorfan (w postaci bromowodorku) 15 mg

oraz substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, poliwinylpolidon, laurylosiarczan sodu, talk, stearynian magnezu.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Rzeszowie
Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie
ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Acodin i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Acodin
3. Jak stosować lek Acodin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Acodin
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Acodin

1 Co to jest lek Acodin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acodin występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną dekstrometorfan. Dekstrometorfan wykazuje działanie przeciwkaszlowe; hamuje odruch kaszlowy poprzez bezpośrednie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. W dawkach terapeutycznych nie wpływa hamująco na czynność oddechową i działanie aparatu rzęskowego oskrzeli (struktura odpowiedzialna za transport wydzielonego śluzu).

Dekspantenol odgrywa istotną rolę w przemianie materii, w tym w regeneracji błon śluzowych dróg oddechowych..

Lek Acodin stosuje się w okresowym hamowaniu nieproduktywnego kaszlu (tak zwany kaszel suchy, nie związany z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych) o różnym pochodzeniu:

- przeziębienia
- kaszle opłucnowy (np. urazy klatki piersiowej)
- kaszle wywołany wdychaniem substancji drażniących.

2 Zanim zastosuje się lek Acodin

Nie należy stosować leku w przypadku:

- Nadwrażliwości na dekstrometorfan lub którykolwiek składnik leku.
- Jednoczesnego stosowania leków z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona); należy również zachować 14-dniową przerwę między zaprzestaniem podawania inhibitorów MAO, a rozpoczęciem stosowania dekstrometorfanu.
- Niewydolności oddechowej lub ryzyka jej wystąpienia.
- W astmie oskrzelowej.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Acodin:

- U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby; w takim przypadku należy zmniejszyć dawki leku lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi.
- Lek hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny.
- Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z produkcją zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli.

Stosowanie leku Acodin z jedzeniem i piciem:

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Stosowanie leku Acodin u dzieci:

Lek stosuje się u dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

Ciaża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

W dawkach terapeutycznych lek nie powoduje ograniczenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Stosowany w dawkach większych, niż zalecane działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować równocześnie dekstrometofanu i leków z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona). Jednoczesne podawanie tych leków może powodować wystąpienie objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenia mięśniowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi).

Dekstrometofan nasila działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

3 Jak stosować lek Acodin

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

15 mg (1 tabletkę) co 4 godziny

lub 30 mg (2 tabletki) co 6-8 godzin.

Nie należy przekraczać dobowej dawki 120 mg dekstrometofanu (8 tabletek).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Acodin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Acodin niż zalecana:

W wyniku przedawkowania leku mogą wystąpić następujące objawy: pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji. Bardzo duże dawki dekstrometofanu mogą spowodować spowolnienie oddechu.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miłkowska 15

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe. Można zastosować płukanie żołądka. Istnieją doniesienia o skutecznym zastosowaniu naloksonu jako specyficznej odtrutki podczas przedawkowania u dzieci.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Acodin:

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Acodin może powodować działania niepożądane.

W trakcie stosowania leku Acodin działania niepożądane występują rzadko.

Mogą wystąpić: lekka senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Acodin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5 Przechowywanie leku Acodin

Lek przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6 Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Data opracowania ulotki:

2008 -11- 05

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Młodowa 15