

**Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym**  
(*Hexylresorcinolum* + *Benzalkonii chloridum*)  
2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

**Skład:**

1 tabletki do ssania zawiera jako substancję czynną 2,5 mg heksyloresorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego oraz substancje pomocnicze: sacharozę granulowaną i płynną glukozę (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.

**Dostępne opakowania:**

Opakowania tekturowe zawierające 10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki.

**Spis treści:**

1. Co to jest lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
3. Jak stosować lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

**1. CO TO JEST LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE**

Tabletki do ssania Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksyloresorcynol oraz chlorek benzalkoniowy, charakteryzujący się działaniem antyseptycznym.

Tabletki do ssania Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

**2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM**

*Nie należy stosować leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym, jeśli:*

- występuje nadwrażliwość na heksyloresorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

*Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym*

Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

*Stosowanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym u dzieci*

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

*Ciąża*

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

*Karmienie piersią*

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

*Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn*

Stosowanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

*Stosowanie innych leków*

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym z innymi lekami.

**3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM**

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli. Można przyjąć maksymalnie 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli. Można przyjąć maksymalnie 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

*W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym*

Przedawkowanie heksylorezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

Po przyjęciu ponad 50 tabletek mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i duże pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

*W przypadku pominięcia dawki leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym*

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

#### **5. PRZECHOWYWANIE LEKU CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM**

Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

#### **6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
tel. (22) 576 90 00

#### **Wytwórca:**

Ernest Jackson&Co Ltd., Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania

Cholisept jest zastrzeżoną nazwą handlową.