

GASTRANIN Zdrovit

Hasło:

Zgaga. Niestrawność. Nadkwaśność.

Skład:

1 tabletkę zawiera: 150 mg *Ranitidinum* (Ranitydyny) w postaci chlorowodoru

Działanie:

Ranitydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku (zarówno podstawowe, jak i po-posiłkowe), a także zmniejsza wydzielanie pepsyny w żołądku. Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu przez około 12 godzin.

Wskazania:

Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych takich jak: zgaga, niestrawność, nadkwaśność, nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ranitydynę lub którykolwiek składnik preparatu, porfiria. Ze względu na zawartość aspartamu preparatu nie należy stosować u chorych na fenylketonurię.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: 1 tabletkę na dobę. Maksymalnie można przyjąć 2 tabletki w ciągu doby. Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić przygotowany roztwór.

W przypadku gdy objawy dyspeptyczne utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy zweryfikować diagnozę.

Postać farmaceutyczna:

Tabletki musujące

Opakowanie:

10 tabletek musujących

Św. Rej. MZ Nr:

10730

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
