

Venescin[®] forte

tabletki drażowane

Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum 100 mg + 60 mg

tabletki drażowane

Skład: 1 tabletki drażowana zawiera

- **Substancje czynne:**

Hippocastani seminis extractum siccum - 100 mg

Rutosidum - 60 mg

- **Substancje pomocnicze:**

celuloza mikrokrystaliczna (E 460), laktoza, sól sodowa glikolanu skrobi, magnezu

stearynian (E 470 b), sacharoza, talk (E 553 b), guma arabska (E 414), kalafonia, olej

rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132)

Opakowanie jednostkowe stanowi kartonik zawierający 30 tabletek drażowanych.

Co to jest Venescin[®] forte i w jakim celu się go stosuje

Zawarty w leku wyciąg suchy z nasion kasztanowca pospolitego działa przeciwobrzękowo i zwiększa tonus żył. Zastosowanie wyciągu z nasion kasztanowca powoduje poprawę takich objawów przewlekłej niewydolności żylniej jak np. obrzęki, ból, świąd, tkliwość. Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.

Wskazania do stosowania:

Przewlekła niewydolność żylna różnego pochodzenia objawiająca się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości (żylakach).

Zanim zastosuje się Venescin[®] forte

Nie należy stosować leku Venescin[®] forte przy nadwrażliwości na składniki leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując Venescin[®] forte, gdyż:

Zastosowanie w żylakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Venescin[®] forte u dzieci:

Nie podawać dzieciom.

Stosowanie leku Venescin[®] forte w okresie ciąży i karmienia piersią:

W badaniach klinicznych obejmujących kobiety ciężarne nie obserwowano żadnych niepożądanych efektów po zastosowaniu ekstraktu z nasion kasztanowca, lecz zgodnie z ogólną praktyką medyczną, lek powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia tylko wówczas , jeżeli zdaniem lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Venescin[®] forte:

Stosowanie innych leków:

Brak doniesień.

Jak stosować Venescin[®] forte

Dorośli doustnie: 3 razy dziennie od 1 do 2 tabletek drażowanych.
Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku. Nie podawać dzieciom.

W przypadku zażycia większej dawki leku Venescin[®] forte niż zalecana:

Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Venescin[®] forte:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności i dolegliwości żołądkowe.
W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów przerwać leczenie, jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarka.

Przechowywanie leku Venescin[®] forte

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Wrocławskie Zakłady Zielańskie "Herbapol" S.A. - ul. Św. Mikołaja 65/68 - 50-951 Wrocław -
Tel. 071 33 57 225; 071 344 66 35 - Fax: 071 372 47 40