

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Biotebal 2,5 i Biotebal 5 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

BIOTEBAL 2,5 2,5 mg, tabletki

BIOTEBAL 5 5 mg, tabletki
(Biotinum)

Skład leku

Jedna tabletki zawiera:

substancję czynną odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg biotyny oraz

substancje pomocnicze: sorbitol, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną.

Opakowanie

30 tabletek w blistrach lub w polietylenowym pojemniku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

- 1. Co to jest Biotebal 2,5 i Biotebal 5 i w jakim celu się go stosuje**
- 2. Zanim zastosuje się Biotebal 2,5 i Biotebal 5**
- 3. Jak stosować Biotebal 2,5 i Biotebal 5**
- 4. Możliwe działania niepożądane**
- 5. Przechowywanie leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5**
- 6. Inne informacje**

1. Co to jest Biotebal 2,5 i Biotebal 5 i w jakim celu się go stosuje

Lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.

Biotebal 2,5 i Biotebal 5 stosuje się w niedoborze biotyny.

Niedobór biotyny powoduje u ludzi zapalenie skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, zapalenie spojówek, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierną łamliwość, zaburzenia przemiany tłuszczów.

Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

2. Zanim zastosuje się Biotebal 2,5 i Biotebal 5

Nie należy stosować leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5, jeśli:

- u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5.

Stosowanie leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 z jedzeniem i pićm

Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek ***Ciąża***

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym okresie.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do mleka kobiecego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Z tego powodu leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) oraz alkohol powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.

3. Jak stosować lek Biotebal 2,5 i Biotebal 5

Lek Biotebal 2,5 i Biotebal 5 należy stosować zgodnie z informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zwykle 2,5 mg do 5 mg na dobę.

Uwaga: lek należy stosować regularnie.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 niż zalecana

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Biotebal 2,5 i Biotebal 5 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka. U niektórych osób w czasie stosowania leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Chronić przed wilgocią.

Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Uwaga: w pojemniku znajduje się środek pochłaniający wilgoć oznakowany w języku angielskim *Do not eat*. Nie nadaje się on do spożycia i powinien pozostawać w pojemniku przez cały okres stosowania leku.

Nie należy stosować leku Biotebal 2,5 i Biotebal 5 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki:

27.02.2008 r.